



L'Ataxie Néonatale

Coton de Tuléar



UNE GRAVE MALADIE HÉRÉDITAIRE

L'Ataxie Néonatale conduit à une dégénérescence du système nerveux. Les premiers symptômes se manifestent dès la naissance par des troubles de l'équilibre et l'incapacité du chiot à coordonner ses mouvements. Les chiots incapables de rester debout ou de se déplacer doivent être euthanasiés.



UNE MALADIE ASSEZ FRÉQUENTE

Environ **10% des Coton de Tuléar en Europe sont porteurs de la mutation génétique** responsable de l'Ataxie Néonatale. Vous pouvez accoupler sans le savoir un mâle porteur et une femelle porteuse et engendrer une portée avec des chiots atteints.

Un chien reproducteur qui est porteur sain, ne développe pas la maladie mais la transmet à 50% de sa descendance. Un étalon, porteur de la mutation et qui se reproduit beaucoup, propage alors la maladie au sein de la race et contribue à augmenter la fréquence de la mutation et à multiplier le nombre de chiots atteints.



UNE MALADIE ÉVITABLE

Un test ADN, appelé test BNAT (Bandera's Neonatal Ataxia) permet de dépister l'Ataxie Néonatale du Coton de Tuléar avec une fiabilité supérieure à 99%. Ne prenez pas le risque de faire naître des chiots atteints, pensez à dépister vos reproducteurs grâce à un simple frottis buccal.