

Votre meilleur conseil pour les AmStaff : le test NCL-A

7% d'atteints
40% de porteurs

Ataxie Cérébelleuse : origines et symptômes

- Dégénérescence du cervelet provoquant une perte d'équilibre, une démarche vacillante jusqu'à l'incapacité de se déplacer
- Premiers symptômes entre 3 et 5 ans
- Race concernée : Staffordshire Terrier Américain (AmStaff)



Le test NCL-A : un diagnostic médical fiable



Vous recevez en consultation un AmStaff présentant un tableau clinique d'ataxie, le test NCL-A vous permettra :

- d'avoir une alternative simple et rapide au diagnostic par IRM
- d'obtenir un diagnostic de certitude rapide en 3 à 8 jours
- d'apporter une réponse claire à votre client sur la maladie de son chien
- d'organiser rapidement la prise en charge de l'animal et de son propriétaire

Le test NCL-A : un dépistage en vue de la reproduction

Trop de propriétaires d'AmStaff font une portée ou une saillie sans avoir conscience que 40% de ces chiens sont porteurs de l'Ataxie Cérébelleuse et vont transmettre la maladie

- Questionnez le propriétaire sur sa volonté de faire une portée
- Expliquez au propriétaire les risques de produire des chiots atteints
- Donnez des conseils simples sur l'intérêt du dépistage précoce
- Proposez d'adapter les accouplements : éviter d'accoupler 2 chiens porteurs entre eux

